

核准日期: 2007年03月07日  
修改日期: 2008年09月02日 2013年11月28日 2016年06月02日 2017年04月05日 2020年08月01日  
2021年03月09日

华纳福  
HUANAFU

# 胶体果胶铋干混悬剂说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】通用名称: 胶体果胶铋干混悬剂

商品名称: 华纳福

英文名称: Colloidal Bismuth Pectin for Suspension

汉语拼音: Jiaoti Guojiaobi Ganhunxuanji

【成份】本品活性成份为: 胶体果胶铋, 是一种果胶与铋生成的组成不定的复合物。

【性状】本品为微黄色粉末或颗粒。

【适应症】本品适用于治疗消化性溃疡, 特别是幽门螺杆菌相关性溃疡, 亦可用于慢性浅表性和萎缩性胃炎。

【规格】150mg (以铋计)

【用法用量】口服。一次150mg (1袋), 加入到100ml温水中, 混悬均匀后服用。一日4次, 分别于3餐前1小时及临睡前服用, 四周为一个疗程。

【不良反应】偶可出现恶心、便秘等消化道症状。

【禁忌】对本品过敏及肾功能不全者禁用。

【注意事项】(1)本品连续使用一疗程后, 症状未缓解或消失请咨询医师。

(2)服药期间若出现黑褐色无光泽大便但无其他不适, 为正常现象。停药后1~2天后粪便色泽可转为正常。

(3)服用本品期间不得服用其他铋制剂, 且本品不宜大剂量长期服用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用。哺乳期妇女应用本品时应暂停哺乳。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】本品不宜与制酸药、牛奶和H<sub>2</sub>受体阻滞药同时服用, 否则会降低药效。

【药物过量】本品若大剂量长期服用, 会出现铋中毒现象, 表现为皮肤为黑褐色, 应立即停药并作适当处理。

【药理毒理】药理作用: 本品为胃肠黏膜保护药。口服后在胃液内形成溶胶, 与溃疡面及炎症表面有很强的亲和力, 能形成有效的保护膜, 隔离胃酸, 保护受损的黏膜, 并刺激胃肠黏膜上皮细胞分泌粘液, 促进上皮细胞自身修复。本品对受损黏膜的粘附性甚佳。本品尚能杀灭胃幽门螺杆菌。

毒理研究: 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药代动力学】本品口服后在肠道吸收甚微, 血药浓度与尿药浓度极低, 绝大部分本品随粪便排出体外。痕量的铋吸收后主要分布于肝、肾等组织中, 以肾脏居多, 主要通过肾排泄。

【贮藏】遮光, 密封, 在干燥处保存。

【包装】聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜包装。12袋/盒。

【有效期】36个月

【执行标准】国家食品药品监督管理局标准YBH00552015及国家食品药品监督管理局药品补充申请批件2017B00026

【批准文号】国药准字H20052104

【药品上市许可持有人】企业名称: 湖南华纳大药厂股份有限公司

注册地址: 湖南浏阳生物医药园区

【生产企业】企业名称: 湖南华纳大药厂股份有限公司

生产地址: 浏阳经济技术开发区健康大道南路5号

邮政编码: 410331

电话号码: 0731-85910590

传真号码: 0731-85910590

网 址: [Http://www.warrant.com.cn](http://www.warrant.com.cn)